

薬剤名	ヒュミラ	シムジア	レミケード	ステラーラ	コセンテックス	ルミセフ	トルツ	トレムフィア	スキリージ	イルミア
一般名	アダリムマブ	セルトリズマブ ベゴル	インフリキシマブ	ウステキヌマブ	セクキヌマブ	プロダルマブ	イクセキズマブ	ゲセルクマブ	リサンキズマブ	チルドラキズマブ
作用機序	TNF- $\alpha$	TNF- $\alpha$	TNF- $\alpha$	IL12/23 p40	IL-17A	IL-17受容体A	IL-17A	IL-23p19	IL-23p19	IL-23p19
投与方法	皮下注射	皮下注射	点滴静注	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射
オートインジェクター製剤	あり	あり	-	なし	あり	なし	あり	なし	なし	なし
投与間隔	2週間に1回	初回投与後 2週後 4週後 以降2週間 もしくは 4週間に1回	初回投与後 2週後 6週後に投与し 以降8週間に1回 (効果不十分又は効果が減弱した場合、 最短の投与間隔4週間)	初回投与後 4週後に投与し、 以降12週間に1回	初回投与後 1週後 2週後 3週後 4週後に投与 し、以降4週間に1回	初回投与後 1週後 2週後に投与 し、以降2週間に1回	初回投与後 2週後 4週後 6週後 8週後 10週後 12週後に投与 し、以降4週間に1回	初回投与後 4週後に投与 し、以降8週間に1回	初回投与後 4週後に投与 し、以降12週間に1回	初回投与後 4週後に投与 し、以降12週間に1回
皮膚科での適応症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 化膿性汗腺炎 壞疽性膿皮症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症	尋常性乾癬 関節症性乾癬	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症 掌蹠膿疱症	尋常性乾癬 関節症性乾癬 膿疱性乾癬 乾癬性紅皮症	尋常性乾癬
他科での適応症	関節リウマチ 強直性脊椎炎 若年性特発性関節炎 クローン病 腸管型ベーチェット病 潰瘍性大腸炎 ぶどう膜炎	関節リウマチ	関節リウマチ 強直性脊椎炎 クローン病 潰瘍性大腸炎 腸管型ベーチェット病 神経型ベーチェット病 血管型ベーチェット病 ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 山崎病	クローン病	強直性脊椎炎	なし	なし	なし	なし	なし
自宅での投与	可能	可能	不可能	不可能	可能	可能	可能	不可能	不可能	不可能