

## mFOLFOX6+アバスチン療法について

mFOLFOX6 療法は、エルプラット(成分名：オキサリプラチン)と5-FU(成分名：フルオロウラシル) という2つの抗がん剤と、アイソボリンという5-FUの作用を強めるお薬を組み合わせた治療のことを言います。この療法にさらにアバスチンという分子標的治療薬(抗がん剤)を組み合わせます。これらのお薬は、それぞれがん細胞への作用の仕方や副作用の違いがあるので、組み合わせて使うことで、より効果的にがんを治療することができます。これにより、がんを小さくしたり、広がるのを抑えたり、がんによる症状を軽くしたりします。しかし、抗がん剤はがん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えてしまうため、多くの場合で副作用も起こってしまいます。

### ◎治療スケジュール

お薬名	1日目	2日目	3日目~14日目
アバスチン			お休み (※)
エルプラット			
アイソボリン			
5-FU			
5-FU (持続点滴)			
(※)	症状や経過に合わせてお休み期間は変わります。		
	上の表の1日~14日を1回の治療として繰り返し行います。		



### ◎1日目の投与スケジュール

治療時間の目安 治療開始から約3時間~4時間

インフューザーポンプでの治療時間約46時間

順番	薬剤名	薬効	投与方法	投与時間
①	アバスチン	分子標的治療薬 (抗がん剤)	点滴	約90分(初回) 約60分(2回目) 約30分(3回目以降)
②	ナゼア デカドロン	吐き気予防	点滴	約30分
③	エルプラット	抗がん剤	点滴	約2時間 ※同時に投与します
	アイソボリン	5-FUの効果を高める	点滴	
④	5-FU	抗がん剤	管注	約5分
⑤	5-FU	抗がん剤	インフューザー ポンプ	約46時間