

東邦大学医療センター大森病院 トレーシングレポート パクリタキセル (PTX) 単独療法

処方医

科 先生

報告日: 年 月 日

処方発行日	年 月 日	調剤日	年 月 日
患者ID		保険薬局名	
患者氏名		担当薬剤師	
生年月日		TEL番号( - - )	FAX番号( - - )

聞き取り日: 月 日

聞き取り方:  来局時  電話  その他( )

アドヒアランス:  良好  不良( )

副作用モニタリング(有害事象共通用語基準v5.0)

Grade	0	1	2	3	4	発現時期
悪心	なし	吐き気はあったが食事摂取量は変わらず	吐き気で食事が減った	吐き気で食事が摂れない	—	
嘔吐	なし	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する	TPN/入院を要する	生命を脅かす	
下痢	なし	普段より1~3回/日多い	普段より4~6回/日多い	普段より7回/日以上多い	生命を脅かす	
便秘	なし	緩下剤, 浣腸を不定期使用	緩下剤, 浣腸を定期使用	日常生活に支障を来す強固な便秘	生命を脅かす	
口腔粘膜炎	なし	軽度の痛みで食事摂取量は変わらず	痛みを認め食事に工夫を要する	痛みが強く食事が摂れない	生命を脅かす	
末梢神経障害	なし	多少痺れはあるが日常生活に支障はない	痺れにより動作に支障は認めるが、日常生活に支障はない	痺れにより日常生活に支障がある	生命を脅かす	
筋肉痛 関節痛	なし	軽度の疼痛	中等度の疼痛, 日常生活に支障はない	高度の疼痛, 日常生活に支障がある	—	
脱毛	なし	遠くからでは分からない かつら必要としない	他人にも容易に明らかな脱毛 かつらが必要	—	—	
爪変色 脱落	なし	症状のない爪の剥離, 脱落	症状のある爪の剥離, 脱落	—	—	
発熱	なし	38-39°C	>39-40°C	>40°C	—	

\*太枠は予定外受診を促す目安です

副作用に関する具体的な内容や指示した対応法

次回外来時に処方提案したい内容