東邦大学医療センター大森病院

<u>レジメン名:ラムシルマブ (RAM) + EGFR-TKI</u>

癌種:非小細胞肺癌

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	Day (1コース:14日)													
				(速度)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	クロルフェニラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	5分	\rightarrow													
2	ラムシルマブ 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	60分	\downarrow													
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	\rightarrow													
-	エルロチニブ	150mg/day	内服	_	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1
又は																		
-	ゲフィチニブ	250mg/day	内服	_	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1	分1

備考

エルロチニブとの併用: RELAY試験 Lancet Oncol 2019; 20: 1655–69

ゲフィチニブとの併用: 2021.3現在 論文化されていません。

化学療法歴のないEGFR遺伝子変異陽性の進行・再発の非小細胞肺がん患者に使用します。

2021.3