

癌種：非細胞肺癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
2	ベバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	30～90分	↓																				
3	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 235mg 4.95mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
4	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	10分	↓																				
5	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

備考

PointBreak試験 J Clin Oncol 2013; 31: 4349-4357.

Stage IV 非扁平非小細胞肺癌

ペメトレキセドによる重篤な副作用の発現軽減のため葉酸およびビタミンB12を投与します。(詳細は添付文書 参照)

ホスアプレピタントからホスネツピタントに変更(2024.2)