東邦大学医療センター大森病院

<u>レジメン名:ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA療法</u>

癌種:非小細胞肺癌 2024.2

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	Day (1コース:42日)				
				(速度)	1	2~21	22	23~42	
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	\rightarrow		\rightarrow		
2	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	60分	\downarrow				
	生理食塩液	100mL					V		
3	生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	\downarrow				
4	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	\downarrow				
	生理食塩液	50mL							
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	\downarrow		\downarrow		
6	ファモチジン	20mg	点滴静注	30分	↓				
	クロルフェニラミン	5mg							
	ホスネツピタント	235mg							
	ホスアプレピタント	0.75mg					\		
	デキサメタゾン	4.95mg							
	生理食塩液	100mL							
7	パクリタキセル	200mg/m2	点滴静注	180分	\downarrow				
	生理食塩液	500mL					\		
8	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	\downarrow				
	5%ブドウ糖液	250mL					V		
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	$\overline{\downarrow}$		\downarrow		

備考

論文化されていません。

|併用療法を1サイクル投与し、その後ニボルマブ+イピリムマブ維持療法となります。

未治療の非小細胞肺癌(扁平上皮癌)に使用します。

ホスアプレピタントからホスネツピタントに変更(2024.2)