

東邦大学医療センター大森病院

レジメン名：ニボルマブ480 (NIVO) 単剤療法

2020.10

癌種：がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌

レジメン内容

| No | 薬剤名                | 標準投与量               | 投与方法 | 投与時間<br>(速度) | Day (1コース：28日) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------------------|---------------------|------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                    |                     |      |              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1  | クロルフェニラミン<br>生理食塩液 | 5mg<br>50mL         | 点滴静注 | 15分          | ↓              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 生理食塩液              | 50mL                | 点滴静注 | 5分           | ↓              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | ニボルマブ<br>生理食塩液     | 480mg/body<br>100mL | 点滴静注 | 60分          | ↓              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 生理食塩液              | 50mL                | 点滴静注 | 5分           | ↓              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

備考

国際共同第III相試験 (ONO-4538-12試験) Lancet. 2017; 390: 2461-2471

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 (3rd Line)

ニボルマブ (NIVO) にてPD (病態進行) になった症例の次コースは、トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) を使用することがあります。