

癌種：胃癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 100mL	点滴静注	10分	↓																				
2	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	40mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓																				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
-	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム(S-1)	備考参照	内服	-	分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1				

備考

術後化学療法 無作為化第 III 相試験(JACCRO GC-07) J Clin Oncol. 2019; 37: 1296-1304.

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 投与量 1.25m² 未満：40mg/回, 1.25m² 以上1.50m² 未満：50mg/回, 1.50m² 以上：60mg/回

サイクル1：S-1のみ (2投1休), サイクル2～7：S-1+DTX, サイクル8～：S-1のみ (4投2休) 合計1年治療を行います。

S-1はday2から内服することも可