

癌種：胃癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
2	デキサメタゾン クロルフェニラミン パロノセトロン 生理食塩液	3.3mg 5mg 0.75mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
3	トラスツズマブ 生理食塩液	6mg/kg (初回8mg/kg) 250mL	点滴静注	30~90分	↓																				
4	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 3.3mg 500mL	点滴静注	120分	↓																				
5	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	15分	↓																				
-	カペシタビン	備考参照	内服	-	分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1					

備考

European Journal of Cancer 2015; 51: 482- 488

進行再発胃癌(HER2 陽性)の1st Line

カペシタビン (1000mg/m²) 【C法】 1.36m² 未満：1200mg/回, 1.36m² 以上1.66m² 未満：1500mg/回, 1.66m² 以上1.96m² 未満：1800mg/回, 1.96m² 以上：2100mg/回

カペシタビンはday2から内服することも可