

東邦大学医療センター大森病院 トレーシングレポート
ドキシソルピシン塩酸塩リポソーム(PLD)+ベバシズマブ(B-mab)療法

処方医

_____科 _____先生

報告日: _____年 _____月 _____日

処方発行日	年 月 日	調剤日	年 月 日
患者ID		保険薬局名	
患者氏名		担当薬剤師	
生年月日		TEL(- -)	FAX(- -)

聞き取り日: _____月 _____日

聞き取り方: 来局時 電話 その他()アドヒアランス: 良好 不良()

副作用モニタリング(有害事象共通用語基準v5.0)

Grade	0	1	2	3	4	発現時期
悪心	なし	吐き気はあったが食事摂取量は変わらず	吐き気で食事が減った	吐き気で食事が摂れない	—	
嘔吐	なし	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する	TPN/入院を要する	生命を脅かす	
便秘	なし	緩下剤, 浣腸を不定期使用	緩下剤, 浣腸を定期使用	排便を要する頑固な便秘	生命を脅かす	
手足症候群	なし	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化 (例: 紅斑, 浮腫)	疼痛を伴う皮膚の変化 (例: 角層剥離, 水疱, 出血, 亀裂)	疼痛を伴う高度な皮膚の変化 (例: 角層剥離, 水疱, 出血, 亀裂)	—	
口腔粘膜炎	なし	軽度の痛みで食事摂取量は変わらず	痛みを認め食事に工夫を要する	痛みが強く食事が摂れない	生命を脅かす	
倦怠感	なし	だるさがある, または元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある	—	
発熱	なし	38-39℃	>39-40℃	>40℃	—	
脱毛	なし	遠くからでは分からない かつらが必要としない	他人にも容易に明らかな脱毛 かつらが必要	—	—	
心不全	なし	症状はないが検査値や画像で異常がある	中等度の活動や労作で症状がある	安静時, わずかな労作で症状がある	—	
鼻出血	なし	治療を要さない(軽度な症状)	内科的治療を要する(中等度な症状)	輸血を要する, 侵襲的治療を要する	—	
高血圧	なし	収縮期血圧120-139または 拡張期血圧80-89	収縮期血圧140-159または 拡張期血圧90-99	収縮期血圧160以上または 拡張期血圧100以上	生命を脅かす	

副作用に関する具体的な内容や指示した対応法

次回外来時に処方提案したい内容