

推奨度	第一推奨薬		第二推奨薬
商品名	カリメート		ロケルマ 懸濁用散分包5g
	経口液20%	ドライシロップ92.59%	
メーカー	興和創薬		アストラゼネカ
一般名	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		ジルコニウム シクロケイ酸ナトリウム水和物
規格・単位	25g(成分量5g)/包	5.4g(成分量5g)/包	5g/包
効能・効果	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症		高カリウム血症
用法・用量	1日75～150g(成分量15～30g), 分2～3	1日16.2～32.4g(成分量15～30g), 分2～3	<初>1日30g, 分3, 2日間, ※最長3日間 <維>1日5g, 分1, 適宜増減 <最大>1日15g, 分1 〔血液透析〕非透析日に1日5g, 分1 <最大>1日15g, 分1
	—	1回量を水30～50mLに懸濁	1包あたり約45mLの水に懸濁して投与
作用発現時間	1～3時間	1～3時間	1時間
経管投与	必要な液量	1包当たり10～15mLの水に懸濁	1包当たり25mLの水に懸濁
	外径サイズ	12Fr以上	8Fr以上
薬価	72.0/包	11.2/g	1,042.1
1日薬価 (維持量)	216.0 (75g/日)	181.4 (16.2g/日)	1,042.1 (5g/日)
禁忌	腸閉塞		—
重大な副作用	腸管穿孔・腸閉塞・大腸潰瘍		低カリウム血症, うっ血性心不全

経口高カリウム血症治療薬

患者背景を確認（該当項目が1つでもある）

- 服薬管理が不良
- 腸管の通過障害の既往がある
- 腎障害に起因しない高カリウム血症

なし

第一推奨
カリメート経口液・ドライシロップ

あり

第二推奨
ロケルマ懸濁用散分包

腎障害に起因しない高カリウム血症に対して、**早期の作用発現を期待して『ロケルマ懸濁用散分包』を導入した場合は、短期間の使用**となるよう配慮すること。